



PRIVATPRAXIS DR. [H] THOMAS HAFFNER

CHIRURGIE, PHLEBOLOGIE, COSMETIC SURGERY

FLANDRISCHE STR. 13 50674 KÖLN (AM RUDOLFFPLATZ)

0221 257 2976 INFO@PRAXIS-DRHAFFNER.DE

WWW.AESTHETIC-CARRE.DE WWW.PRAXIS-DRHAFFNER.DE

Die Unterlidstraffung

Die Wirkung der Schwerkräfte und der Natur erkennt man schon im jugendlichen Alter auf dem Unterlid: gesunde und vitale Menschen wirken dadurch müde, obwohl sie noch relativ jung sind. Die Lösung ist die professionelle Unterlidstraffung, welche bei richtiger Schnitfführung kaum Narben hinterlässt.

Korrektur der Tränensäcke durch Unterlidstraffung	Typische Hautveränderungen vor Unterliderschaffung
	
<p>Demonstration der Wirkung einer Unterlidstraffung bei Dr. Haffner in Köln, welche hier mit Mittelgesichtsanhebung kombiniert wurde: Glatte Hautkonturen nach Haut- und Muskelstraffung. Gefüllt, jugendlich aussehender Unterlidbereich, welcher sich aus dem angeschlossenen Mittelgesichtslift ergibt.</p>	<p>Die "Tränensäcke" vor einer Unterlidstraffung bestehen aus</p> <ul style="list-style-type: none">- Hautfalten- Vorfallendem Augenfett- Muskelringen, die Hautfalten verursachen- Dunklere, flache Unterlidkante bei Mittelgesichtssenkung



PRIVATPRAXIS DR. [H] THOMAS HAFFNER

CHIRURGIE, PHLEBOLOGIE, COSMETIC SURGERY

FLANDRISCHE STR. 13 50674 KÖLN (AM RUDOLFFPLATZ)


0221 257 2976 INFO@PRAXIS-DRHAFFNER.DE

WWW.AESTHETIC-CARRE.DE WWW.PRAXIS-DRHAFFNER.DE

Glatte Konturen und gefüllte, jugendliche
Erscheinung des Unterlids nach
**Unterlidstraffung und Anheben des Mittelgesichts
(SOOF Lift)**



Die **dunklen Augenringe** und das müde
Aussehen sind durch Vorfall des Augenfettes und
Absinken des Mittelgesichts entstanden.
Bild links vor Unterlidstraffung.



Der Schnitt erfolgte von außen, am Rande der
Lidkante. Durch Zugentlastung vom Operateur
entstanden keine sichtbaren Narben.

Die Unterlidstraffung kann man aber auch ganz ohne
Hautschnitt durchführen. Die vorfallenden, sich
vorwölbenden Fettdepots werden bei der
hautschnittfreien Unterlidkorrektur durch inneren
Bindehautschnitt entfernt.

Junger Patient, der wegen des vorfallenden,
drückenden inneren Augenfettes "müde" aussieht.
Störend sind auch die dunklen Augenringe, die
durch schwaches Bindegewebe entstehen. Hier
hilft die Augenfettentfernung allein nicht, eine
zusätzliche Verpflanzung von Eigenfett während
der Op ist notwendig, um den schwach
gepolsterten Unterlidrand zu decken und die
dunklen Ringe zu beseitigen.



PRIVATPRAXIS DR. [H] THOMAS HAFFNER

CHIRURGIE, PHLEBOLOGIE, COSMETIC SURGERY

FLANDRISCHE STR. 13 50674 KÖLN (AM RUDOLFFPLATZ)

0221 257 2976 INFO@PRAXIS-DRHAFFNER.DE

WWW.AESTHETIC-CARRE.DE WWW.PRAXIS-DRHAFFNER.DE

Unterlidstraffung ohne Hautschnitt



Hier wird das Ergebnis einer hautschnittfreien Unterlidstraffung nur 24 Stunden nach dem Eingriff demonstriert.

Der Eingriff erfolgte mit der schnittsparenden Radiowellen-Methode von Dr. Haffner. Das Ergebnis zeigt, wie das Verfahren **mit innerem Zugang** durch die Bindehaut die Unterlidstrukturen schonen kann.



Kandidatin für eine hautschnittfreie Radiowellenunterlidstraffung n. Dr. Haffner

Die ästhetische Harmonie der exotischen jungen Patientin ist allerdings durch die Vorwölbung des inneren Unterlidfettes gestört. Sie braucht weder Hautstraffung, noch Muskelstraffung, noch Lidbandfixierung, ist somit für die hautschnittfreie Unterlidstraffung ideal geeignet:



Risikohinweis: Bei keiner Schönheitsoperation kann eine Erfolgsgarantie gegeben werden und im Einzelfall können Blutergüsse, Entzündungen, innere oder äußere Narben, Knötchenbildung, Schrumpfung oder andere Nebenwirkungen entstehen.

Eine Beratung vor einer Schönheitsoperation muss bei uns mindestens 24 Std vorher erfolgen. Die Risiken müssen von jedem beachtet werden und die postoperativen Kontrolltermine streng eingehalten werden.



PRIVATPRAXIS DR. [H] THOMAS HAFFNER

CHIRURGIE, PHLEBOLOGIE, COSMETIC SURGERY


FLANDRISCHE STR. 13 50674 KÖLN (AM RUDOLFFPLATZ)

0221 257 2976 INFO@PRAXIS-DRHAFFNER.DE

WWW.AESTHETIC-CARRE.DE WWW.PRAXIS-DRHAFFNER.DE

Der Schnapptest

Schnappt sich der Unterlid träge zurück, dann ist das Lidband zu locker.
Eine die Lidstraffung ergänzende Lidbandstraffung am seitlichen Augenwinkel muss dann gemacht werden, welche schon viel Erfahrung in der Lidchirurgie voraussetzt.



Der Verschiebetest

Lässt sich die Unterlidhaut leicht verschieben, Einrollen und hält Ihre Form nach dem Loslassen nur träge, dann ist der gesamte Halteapparat des Unterlids zu locker.



Verlauf:

Op Dauer:

Schwellungenphase und blaue Stellen:

Wundheilung (Fädenziehung)

Verband

Solarium/Saunaverbot

Sport treiben

In örtlicher Betäubung
oder in Vollnarkose meistens ambulant
auf Wunsch jedoch stationär gegen Aufpreis

60-90 Minuten

7-14 Tage

7 Tage

7-10 Tage Mini Strip

4-6 Wochen, vom Verlauf abhängig

leichter Sport nach 10 Tagen erlaubt



PRIVATPRAXIS DR. [H] THOMAS HAFFNER

CHIRURGIE, PHLEBOLOGIE, COSMETIC SURGERY

FLANDRISCHE STR. 13 50674 KÖLN (AM RUDOLFPLATZ)

0221 257 2976 INFO@PRAXIS-DRHAFFNER.DE

WWW.AESTHETIC-CARRE.DE WWW.PRAXIS-DRHAFFNER.DE

Preis :

Die Unterlidstraffung ist viel anspruchsvoller als die Oberlidstraffung, Risikoklasse und der Preis sind somit etwa 40 % erhöht.
Zusatzkosten bei Vollnarkose, bei stationärer Durchführung und beim zusätzlichen Bedarf an Lidbandstraffung, Mittelgesicht- oder Schläfenlift.

Risiken einer Unterlidstraffung:

Schönheitsoperationen sind medizinisch nicht notwendige Operationen, die Risiken und Gesundheitsschäden mitbringen können. Weder die Operationskosten noch die Folgekosten werden von den Krankenkassen übernommen. Gegen die so entstandenen Folgekosten, Revisionen, Hotelkosten, Reisekosten, Kosten des Arbeitsausfalls usw. kann man sich unter www.folgeversicherung.de absichern. Neben den hier dargestellten Risiken wie blauen Flecken, Schwellungen, Blutergüssen, Blutungen, Narben, Ectropion, Entzündungen, Absinken der Lidkante, Wimperproblemen, Cysten, Knubbeln usw. werden Ihnen im Beratungsgespräch ggf. auch noch seltene Risiken erörtert und Ihre Fragen eingehend beantwortet. Das Gespräch findet mindestens einen Tag vor dem Eingriff statt. Bereiten Sie sich mit Fragen auf das Gespräch vor und lassen Sie sich Zeit für Überlegungen nach sorgfältigem Lesen des Aufklärungsbogens und stellen Sie Ihrem Arzt weitere Fragen bei Unklarheiten.